

UEBER THEBAÏN.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE

DER

HOHEN PHILOSOPHISCHEN FACULTÄT

DER

UNIVERSITÄT MARBURG

VORGELEGT

VON

WILLIAM CREWDSON HOWARD

AUS

TOTTENHAM (LONDON).

MARBURG.

1884

HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

THE HERBET J. HERBET

Unter den zahlreichen stickstoffhaltigen Verbindungen haben wohl keine solches Interesse erregt, wie die Alkaloide; trotzdem aber blieb unsere Kenntniss derselben lange eine sehr unvollständige. Obwohl eine Reihe von Methoden zur Synthese organischer Basen durch die Entdeckungen von A. W. Hofmann und Würtz bekannt wurde, ist es erst in der neuesten Zeit gelungen, Einblicke in die Constitution der Basen des Pflanzenreichs zu erhalten. Die Ursache hierfür lag einerseits in der complicirten Natur dieser Verbindungen, welche zu ihrem Verständniss durchaus ein Studium der einfacheren Verhältnisse bedingte, andererseits aber darin, dass die chemische Forschung sich mit Vorliebe einer anderen Richtung zugewandt hatte: der Chemie des Steinkohlentheeres. Auf jenem Gebiete war durch die glückliche Benzoltheorie Kekulé's der Anstoss zu den vielseitigsten Untersuchungen gegeben worden, welche, Hand in Hand mit den Bedürfnissen der Industrie gehend, diese und die Wissenschaft förderten.

Eine gleiche Unterstützung steht jetzt für die Chemie der Alkaloide in Aussicht; und diese sind der Gegenstand zahlreicher und rationell vorgehender Untersuchungen geworden, seitdem Beziehungen zum Pyridin und Chinolin erkannt worden sind.

Die Basen der Chinarinden, ferner Nicotin, Atropin, das Morphin, Narcotin, Berberin, Piperidin und Coniin sind als Derivate des Pyridins erkannt; und da die Annahme, auch die meisten anderen Basen des Pflanzenreichs seien Derivate desselben, nicht unberechtigt erschien, hat man schon die „Alkaloide“ als die „in Planzen vorkommenden Pyridinderivate“

definirt.¹ Ob diese Auffassung auch für das Thebain, den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung richtig ist, darauf komme ich am Schlusse der Abhandlung zu sprechen.

Wesentlich zwei Reactionen waren es, welche einen Zusammenhang verschiedener Alkaloïde mit dem Pyridin resp. Chinolin erkennen liessen: die Kalischmelze und die Oxydation. Die erste Operation führt zu jenen Basen oder deren Homologen, die zweite zu den Carbonsäuren derselben, welche unter Abspaltung von Kohlensäure leicht in die Basen übergeführt werden konnte.

Gehrhardt entdeckte das Chinolin, als er Cinchonin mit Aetzkali erhitzte; die gleiche Reaction wurde später auch bei den anderen Chinabasen untersucht, und trug viel zur Kenntniss derselben bei.

Mit Sicherheit als Pyridincarbonensäure erkannt wurde die Nicotinsäure von Laiblin,² nachdem schon früher Huber³ eine diesbezügliche Vermuthung ausgesprochen hatte. Daran schlossen sich die Arbeiten von Hoogewerff und van Dorp,⁴ Ramsay und Dobbie,⁵ Weidel,⁶ Skraup,⁷ Königs,⁸ welche die Oxydationsproducte der China- und Chinolinbasen untersuchten, und die resultirenden Säuren als Derivate des Chinolins resp. als Pyridintri-, di- und monocarbonensäuren erkannten. Aus Berberin erhielt Weidel⁹ eine Pyridintricarbonsäure; v. Gerichten¹⁰ erkannte die Apophyllensäure, das Oxydationsproduct des Cotarnin's, als Derivat der Cinchomeronsäure, einer Pyridindicarbonensäure, Königs¹¹ oxydirte Piperidin zu Pyridin.

¹ Königs, Studien über die Alkaloïde. 1880. p. 31.

² Laiblin, A. d. Ch. 196. 129. 1877.

³ Huber, Ber. 1870. 849.

⁴ Hoogewerff und van Dorp, A. d. Ch. 204. 84. Ber. 12. 747.

⁵ Ramsay und Dobbie, J. of Ch. Soc. 1879. 189.

⁶ Weidel, A. d. Ch. 173. 76.

⁷ Skraup, Ber. 12. 230. 1104.

⁸ Königs, Ber. 12. 97. 252.

⁹ Weidel, Ber. 12. 415.

¹⁰ v. Gerichten, Ber. 13. 1635.

¹¹ Königs, Ber. 12. 2341.

In dem Opium kommen eine ganze Anzahl von Alkaloiden vor, in grösserer Menge jedoch nur Morphin und Narcotin, eine nahe Verwandtschaft aller Opiumalkaloide scheint nicht vorhanden zu sein; im Gegentheil lässt eine Uebersicht mit Angabe ihrer Zusammensetzung schon hervortreten, dass sie verschiedenen Reihen angehören:

Morphin	$C_{17} H_{19} NO_3$	Papaverin	$C_{21} H_{21} NO_4$
Codein	$C_{18} H_{21} NO_3$	Lanthopin	$C_{23} H_{25} NO_4$
Pseudomorphin	$C_{17} H_{19} NO_4$	Protopin	$C_{20} H_{19} NO_5$
Thebain	$C_{19} H_{21} NO_3$	Cryptopin	$C_{21} H_{23} NO_5$
Codamin	$C_{20} H_{25} NO_4$	Narcotin	$C_{22} H_{23} NO_7$
Landamin		Oxynarcotin	$C_{22} H_{23} NO_8$
Landanosin		Narcein	$C_{23} H_{29} NO_9$
Mekonidin		Hydrocotarnin	$C_{12} H_{15} NO_3$


Die drei erstgenannten: Morphin, Codein und Pseudomorphin, sind mit einander nahe verwandt; und ebenso stehen die vier letztgenannten in Beziehung zu einander, insofern als Narcotin, Oxynarcotin und Narcein den Atomcomplex des Mekonins enthalten, Hydrocotarnin aber sowohl aus Narcotin als auch aus Oxynarcotin erhalten werden kann.

Von den übrigen Opium-Alkaloiden wissen wir nicht viel mehr als ihre Zusammensetzung, welche durch die umfassenden Untersuchungen Hesse's festgestellt wurde; nur das Thebain und Papaverin sind etwas besser bekannt; einer Erforschung ihrer Constitution steht die Schwierigkeit ihrer Beschaffung im Wege, da ihre Menge gegenüber Narcotin und Morphin im Opium sehr zurücktritt.


Bevor ich an die Beschreibung meiner Versuche mit dem Thebain herantrete, beabsichtige ich die Untersuchungen über Opiumalkaloide, soweit sie für die Beurtheilung ihrer Constitution in Betracht kommen, zu besprechen; diese beziehen sich, wie schon erwähnt, nur auf Narcotin und Morphin. Ueber das erstere theile ich nur die wichtigsten Resultate mit, während ich das Morphin ausführlicher behandle, da die bei diesem gemachten Beobachtungen zu meinen Versuchen mit dem Thebain Veranlassung gaben.

Narcotin.


Durch Oxydation und durch Einwirkung von Wasser wird das Narcotin in einen sauren und einen basischen Atomcomplex gespalten; der einfachste Verlauf dieser Spaltung wird durch folgende Gleichung ausgedrückt:



Das Mekonin ist ein Dimethoxyphthalid von folgender Constitution:




Von den complicirten Umsetzungen des Cotarnins ist zu erwähnen seine Umwandlung in Cotarnaminsäure:



welche auf das Vorhandensein einer Gruppe COOCH_3 schliessen lässt.

Durch die Einwirkung von Brom auf Cotarnin wird eine Bromtarkonin $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{BrO}_3$ genannte Verbindung erhalten, welche einerseits durch Oxydation, ebenso wie Cotarnaminsäure, in Apophyllensäure, andererseits in Dibrompyridinmethylchlorid übergeführt wurde. Diese beiden Beobachtungen, welche sichere Anhaltspunkte gaben, denn die Apophyllensäure wurde als Derivat der Cinchomeronsäure erkannt, machte v. Gerichten¹ im Verlaufe seiner schönen Untersuchungen über Cotarnin.


Die Apophyllensäure ist nach v. Gerichten eine Verbindung, welcher folgende Constitution zukommt:



¹ A. 210. 85.

beim Erhitzen mit Chlorwasserstoffsäure liefert sie Cinchomeronsäure.

Die Constitution des Bromtarkonins giebt v. Gerichten durch folgende Formel:



welche jedoch nicht einwurfsfrei ist, denn die Gruppe $\text{C}_4\text{H}_3\text{BrO}-$ kann nicht wohl einwerthig fungiren, und ebenso die Gruppe $\text{C}_5\text{H}_3\text{N}$ nicht dreierthig.

Morphin.

Die wohl schon lange ausgesprochenene Vermuthung, dass Codein in nächster Beziehung zu Morphin stehe, dass es der Methyläther des letzteren sein werde, wurde sehr wahrscheinlich, als Mathiessen und Wright¹ beobachteten, dass sowohl Morphin als Codein beim Erhitzen mit Schwefelsäure resp. Salzsäure Apomorphin liefere; mit Sicherheit konnte man sich über die Beziehungen aber erst aussprechen, als es Grimaux² gelang, ein Methyl in Morphin einzuführen, und er so Codein erhielt.

Das Morphin, eine tertiäre Base, enthält zwei Hydroxyle; es lassen sich zwei Säurereste einführen; das von Polstorff als Tribenzoylmorphin angesprochene Product ist die Dibenzoylverbindung. Behandelt man Morphin bei Gegenwart von Alkalien mit Alkyljodiden, so tritt ein Alkyl an Stelle eines Hydroxylwasserstoffs: so entsteht mit Jodmethyl das Methylmorphin oder Codein. Durch die Einwirkung von Alkali auf gleichzeitig entstandenes Methylmorphinmethyljodid bildet sich zu gleicher Zeit eine Methylmorphimethin (nach Grimaux: Methocodein) genannte Verbindung.

Methylmorphimethin nimmt nur noch ein Säureradical auf; das zweite eingetretene Methyl muss also entweder mit Stickstoff oder mit Kohlenstoff verbunden sein; es ist nicht

¹ A. Spl. 7. 172.

² C. R. 92. 1140.

an das zweite Hydroxyl getreten. Weitere Alkyle einzuführen, gelingt nicht; das Methylmorphimethin jedoch addirt als tertiäre Base Alkyljodide.

Die Zersetzung dieser Methylmorphimethinalkyljodide lieferte sehr interessante Resultate; vorher aber verdienen einige andere Punkte Erwähnung.

Das Hydroxyl, welches den phenolartigen Charakter des Morphins bestimmt, also die Alkyle aufnimmt, geht mit in Apomorphin über.


Auffallend ist, dass Morphinmethyljodid kein Wasserstoffatom gegen Alkyle austauscht; weder lässt sich ein solches in das Hydroxyl einführen, noch findet eine Umlagerung desselben statt, wie diejenige des Methylmorphinmethyljodides in Methylmorphimethin.

v. Gerichten und Schrötter¹ haben vor nicht langer Zeit Beziehungen des Morphins zum Phenanthren kennen gelehrt, welche daher ganz besonders geeignet sind, die Constitution des Morphins aufzuklären.

Bei der Destillation des Morphins mit Zinkstaub beobachteten v. Gerichten und Schrötter Phenanthren, Pyrrol, Pyridin, Trimethylamin und eine Base, die sie für Phenanthrenchinolin halten.

Diese Beobachtungen erhielten eine sehr erwünschte Bestätigung durch eine von denselben Forschern ausgeführte Untersuchung der aus dem Methylmorphiaethinmethyljodid entstehenden Spaltungsproducte.

Die Spaltung von Ammoniumbasen hat A. W. Hofmann² zum Gegenstand einiger interessanter Abhandlungen gemacht. Frühere Untersuchungen hatten ihm gezeigt, dass aliphatische Ammoniumhydroxyde unter Temperatureinfluss zersetzt werden im Sinne der Gleichung:




und eine vorhandene Methylgruppe immer mit dem Stickstoff verbunden bleibt; so entsteht aus $(CH_3)_3 C_2 H_5 N OH = (CH_3)_3 N + H_2 O + C_2 H_4$. Diese Gesetzmässigkeit legte Versuche mit

¹ A. 210. 105.

² Hofmann, Ber. 14. 494. 659. 905.


dem Piperidin nahe. Von diesem hatte Cahours¹ ein Derivat: das Dimethylpiperylammoniumjodid: $C_5H_{10}(CH_3)_2NJ$ kennen gelehrt.

Bei dem Hydroxyde dieser Verbindung erwartete nun Hofmann einen Zerfall der Gruppe C_5H_{10} ; die Reaction verlief aber anders, es entsteht eine tertiäre Base, Dimethylpiperidin: $C_5H_9(CH_3)_2N$ unter einfacher Abspaltung von Wasser:



Durch Einwirkung von Salzsäure auf Dimethylpiperidin wird das tertiäre Methylpiperidin zurückgebildet; diese Beobachtung veranlasste Hofmann für Dimethylpiperidin die Constitution: $(C_5H_9)(CH_3)_2N$ zu verwerfen und anzunehmen, dass das zweite Methyl ein Wasserstoffatom der Gruppe C_5H_{10} vertreten habe, jenes also: $(C_5H_9CH_3)(CH_3)N$ sei, denn jene Verbindung hätte ein secundäres Methylpiperidin bei Herausnahme eines Methyls liefern müssen.

Erst das weitere Additionsproduct des Dimethylpiperidins mit Jodmethyl zerfällt in dem von Hofmann erwarteten Sinne:




Später sind von Michael² und Ladenburg³ andere Ansichten ausgesprochen worden; nach ihnen würde doch die von Hofmann abgelehnte Formel die richtige sein; experimentelle Gründe für diese oder jene Auffassung wurden jedoch nicht gebracht.

Herr Dr. W. Roser macht mich indessen auf folgende Betrachtungen aufmerksam: das Verhalten des Methylpiperidins entspricht vollkommen der von A. W. Hofmann entdeckten Gesetzmässigkeit, wenn man für Piperidin die Constitution:


¹ Cahours, A. ch. ph. (3.) 38. 76.

² Michael, Ber. 14. 2105.


³ Ladenburg, Ber. 16. 2059.



annimmt. Die Umwandlung des Dimethylpiperidylammoniumhydroxydes verläuft ganz analog derjenigen des Trimethyläthylammoniumhydroxydes. Bei dem letzteren wird die Äthylgruppe vom Stickstoff losgelöst, und es findet Zerfall statt; auch in dem Dimethylpiperidylammoniumhydroxyd wird eine Bindung zwischen Kohlenstoff und Stickstoff gelöst; es tritt jedoch kein Zerfall des Moleküles ein, weil das Alkyl zweiwerthig mit dem Stickstoffatome verbunden ist. Die folgenden Formeln zeigen die vollkommene Analogie:



Dem Dimethylpiperidin käme dann die Constitution:






zu, welche auch Ladenburg angiebt (Ber. 16. 2059).

Der Beweis für diese Auffassung dürfte wohl durch eine Synthese nicht allzuschwer zu erbringen sein.

Die von Hofmann beobachtete Zurückverwandlung des Dimethylpiperidins in Methylpiperidin ist dann vielleicht auf eine primäre Addition von Chlorwasserstoffsäure, Bildung eines Ammoniumchlorides und nachfolgende Abspaltung von Chlormethyl zurückzuführen. Auf eine derartige Interpretation weist auch die Untersuchung Merlings¹ hin, welcher als Einwirkungsproduct von Brom auf Dimethylpiperidin ein Ammoniumbromid erhielt; dieses würde nach obiger Auffassung erst secundär aus einem Dibromdimethylpiperidin entstanden sein:

¹ Ber. 17. 2141.





Bromdimethylpiperidinammoniumbromid.

Hiernach wird man zu dem Schlusse geleitet, dass die Basen, bei welchen eine zweimalige Addition eines Jodalkyles an eine Base nothwendig ist, um zu einem Ammoniumhydroxyd zu gelangen, welches beim Erhitzen zerfällt, ein zweiwerthiges Radical durch zwei Kohlenstoffatome an Stickstoff gebunden enthalten.

Ein dem Dimethylpiperidin ganz analoges Verhalten zeigen Dimethylconiin und Dimethylpiperidin (Ber. 14. 1347 und Ber. 17. 2142). Die Beobachtungen Hofmann's gaben v. Gerichten und Schrötter¹ Veranlassung zu gleichartigen Versuchen mit Morphin-Derivaten.


Der Uebergang des Methylpiperidins in Dimethylpiperidin entspricht der von Grimaux² zuerst beobachteten Bildung von Methylmorphimethin (Methocodein) aus Methylmorphin (Codein); v. Gerichten und Schrötter gewannen nun aus Methylmorphin (Codein), Brommethylmorphin (Bromcodein) und aus Aethylmorphin die Verbindungen Methylmorphiaethin, Brommethylmorphiaethin und Aethylmorphiaethin (Codaethylin).




¹ v. Gerichten und Schrötter, Ber. 15. 1484. 2179.

² Grimaux, Ber. 14. 2693.

und untersuchten die Spaltungsproducte der aus diesen erhaltenen Ammoniumhydroxyde. Die Spaltung des aus Methylmorphiaethin dargestellten Ammoniumhydroxydes wird nach v. Gerichten und Schrötter durch folgende Gleichung ausgedrückt:




der Verbindung $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_2$ entsprechende wurden aus Brommethylmorphiaethin und Aethylmorphiaethin gewonnen; jenes gab $\text{C}_{15}\text{H}_9\text{BrO}_2$, dieses $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_2$. Die Verbindung $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_2$ liefert nun mit Zinkstaub destillirt Phenanthren und ist als ein Derivat der Verbindung



aufzufassen; und zwar sind $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_2$ und $\text{O}_{16}\text{H}_{22}\text{O}_2$ Methoxyl- resp. Aethoxylderivate derselben.

Für das basische Spaltungsproduct glauben v. Gerichten und Schrötter gemäss obiger Gleichung und auf Grund der Analyse eines Platinsalzes auf die Zusammensetzung eines Methylaethylpropylamines schliessen zu können; Hesse¹ bemerkt jedoch, dass er aus Methylmorphimethin nicht das Dimethylpropylamin, sondern Trimethylamin erhielt; er möchte jener Gleichung die folgende substituiren:



und weist darauf hin, dass v. Gerichten und Schrötter wirklich Aethylen bei der fraglichen Reaction beobachteten.

Die Beziehungen des Morphins zu Pseudomorphin sind durch Hesse² nachgewiesen; er fand die Identität des letzteren mit der aus Morphin bei Einwirkung von salpetriger Säure oder Kupferoxydammoniak entstehenden Base.


¹ A. 222. 232.

² A. 222. 234.

Thebain.

Das Thebain wurde im Opium von Thiboumery entdeckt; mit seiner Untersuchung beschäftigten sich Pelletier (J. d. Pharm. XXI, 569), Couerbe (A. d. Ch. et de Phys. [2] LIX, 155), Kane (A. d. Ch. u. Pharm. 14. 9) und Anderson (A. 86. 179); Hesse¹ stellte seine Zusammensetzung fest, welche sich aus der Analyse von Salzen und der freien Base gleich $C_{19}H_{21}NO_3$ ergab. Die Base, welche durch Mineralsäuren schon in der Kälte verändert wird, geht nach Hesse beim kurzen Kochen mit verdünnter Salzsäure in das dem Thebain isomere Thebenin über; concentrirte Säure führt sie in eine amorphe Base über, welche Thebaicin genannt wurde.

Vergleicht man das Thebain mit den übrigen Alkaloiden des Opiums bezüglich ihrer Zusammensetzung, so drängt sich die Vermuthung auf, dass das Thebain dem Morphin und Codein verwandt sei, denn diese drei Alkaloide enthalten je drei Atome Sauerstoff im Molecül. Wenn es möglich wäre, dem Thebain zwei Wasserstoffatome zu addiren, würde ein Homologes des Morphin und Codein entstehen:



Es schien nicht unmöglich, dass das Thebain ein Dimethylether eines zweier Wasserstoffatome beraubten Morphins sei.

Eine solche Ueberführung hatte ich im Auge, als ich an die Versuche mit Thebain herantrat; es gelang mir aber eine Reduction in dem angedeuteten Sinne nicht, und nun glaubte ich das von Hesse entdeckte Thebenin als passenden Ausgangspunkt für weitere Versuche wählen zu sollen. Der Gedanke, die von Hesse angegebene Darstellungsmethode dieser Base zu verbessern, liess mich die Beobachtung machen, dass beim Erwärmen des Thebains mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure eine neue, von mir Mor-

¹ A. 153. 69.

phothebain genannte Base entsteht. Diese habe ich näher untersucht.

Daran anschliessend habe ich Alkylhalogenadditionsproducte des Thebains und Morphothebains gewonnen, welche beweisen, dass beide Basen tertiäre sind. Die Zersetzung der ersteren gedachte ich näher zu untersuchen; es war von besonderem Interesse, zu sehen, ob hier wie aus dem Morphin ein Penanthrenderivat entstehe. Jedoch konnte ich die Frage nicht endgültig entscheiden, weil der Zersetzungsprocess ein sehr complicirter ist, die Reindarstellung sehr viel Mühe machte und schliesslich auch das Untersuchungsmaterial fehlte.

Die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Thebain führte nur zu einem amorphen, nicht chlorhaltigen Producte.

Ich gehe nun zur Beschreibung meiner Versuche über.

Einwirkung von Brom auf Thebain.

Da directe Reductionsversuche des Thebains zu keinem Resultate führten, untersuchte ich die Einwirkung von Brom, um das entstehende Bromproduct eventuell zu reduciren.

In einer verdünnten Lösung des Thebains in Bromwasserstoffsäure verursacht Bromwasser die Ausscheidung einer schweren, gelbrothen Verbindung, welche beim Umschütteln der Lösung wieder verschwindet, so lange noch ein Ueberschuss des Thebains vorhanden ist. Durch einen Bromüberschuss wird die gelbrothe Verbindung gefällt; abfiltrirt, mit Wasser sorgfältig ausgewaschen und über Schwefelsäure getrocknet, enthält sie nach dem Ergebniss zweier Analysen 55,7 und 55,4% Brom. Danach ergiebt sich, dass je sechs Atome Brom mit einem Molecül Thebain in Reaction traten, und da die Verbindung bei Gegenwart von überschüssigem Thebain wieder in Lösung geht unter Bildung des nachstehend besprochenen Monobromthebains, so wird man sie als Bromthebaintetrabromid $C_{19}H_{20}BrNO_3Br_4$ aufzufassen haben, welches 56,3 % Br verlangt.

Setzt man der Lösung des Thebains in Bromwasserstoffsäure so viel Bromwasser zu, dass gerade noch ein auch

bei andauerndem Digeriren nicht mehr verschwindender Niederschlag entsteht, und fällt die filtrirte Flüssigkeit mit Ammoniak, so erhält man einen flockigen, anfangs röthlichen, später bläulich werdenden Niederschlag des Bromthebäins $C_{19}H_{20}BrNO_3$. Eine Analyse des über Schwefelsäure getrockneten Productes ergab 23,14 $\frac{0}{10}$ Brom, während die Formel $C_{19}H_{20}BrNO_3$ 20,5 $\frac{0}{10}$ Brom verlangt. Als das Bromthebäintetrabromid, in Wasser suspendirt, bei Gegenwart von Schwefelsäure mit Natriumamalgam behandelt wurde, ging es bald in Lösung; und aus dieser wurde durch Ammoniak eine Verbindung ausgefällt, welche sich wie das Monobromthebain verhielt. Eine Analyse bewies die Identität:

Berechnet:	Gefunden:
für $C_{19}H_{20}BrNO_3$	
Br 20,5 $\frac{0}{10}$	21,26 $\frac{0}{10}$.

Die Verbindung konnte nicht krystallisirt erhalten werden, ebensowenig ein Salz der gebromten Base; daher wurde dieselbe nicht weiter berücksichtigt.

Spaltung des Thebäins durch Chlor- oder Bromwasserstoffsäure.

Wie schon oben bemerkt, suchte ich nach einer Methode, welche das Thebenin in besserer Ausbeute liefere, als die von Hesse angegebene, welche mir anfangs nicht recht gelingen wollte. Ich versuchte daher die Einwirkung von concentrirter Salzsäure in geschlossener Röhre, also unter Druck, welche Modification des Verfahrens eventuell auch eine Abspaltung eines Alkyles zur Beobachtung bringen konnte.

Thebain wurde mit ungefähr der fünffachen Menge concentrirter Chlorwasserstoffsäure in ein Rohr eingeschmolzen und im Wasserbad erwärmt. Die Flüssigkeit färbte sich dunkel, und bei 80° begann die Ausscheidung langer Nadeln; das Erwärmen wurde fortgesetzt, bis sich diese nicht mehr zu vermehren schienen. Gewöhnlich dauerte die Operation bei Anwendung von 3 bis 5 Grm. etwa dreissig Minuten.

Beim Oeffnen der wieder kalt gewordenen Röhre machte sich Druck bemerkbar, und das ausströmende Gas brannte mit grün gefärbter Flamme. Der Inhalt des Rohres wurde auf einen Platinconus gebracht und mit concentrirter Salzsäure gewaschen, bis die zurückbleibenden Krystalle ungefärbt waren. Diese sind, in kaltem Wasser leicht löslich, auch Alkohol löst sie leicht auf; beim Erwärmen der alkoholischen Lösung erfolgt jedoch die Ausscheidung einer anderen Verbindung.

Die zuerst erhaltenen Krystalle sind ein saures Hydrochlorid; das vermittelt Alkohol erhaltene Salz dagegen das neutrale Hydrochlorid einer neuen Base $C_{17}H_{17}NO_3$, für welche ich, um sie als Umwandlungsproduct des Thebaïns zu charakterisiren, die Bezeichnung **Morphothebaïn** gewählt habe.

Das saure Hydrochlorid, dessen Darstellung oben beschrieben ist, wurde zur Analyse im Vacuum über Schwefelsäure und Aetzkali getrocknet.

0,1998 Grm. gaben 0,1291 Chlorsilber.

Berechnet:	Gefunden:
für $(C_{17}H_{17}NO_3HCl)_2HCl$	
H Cl 1,55	15,7

Das Salz verliert beim Trocknen bei 100° Chlorwasserstoffsäure; die Zusammensetzung des Salzes ist zwar recht auffallend; ich glaubte aber derselben kein weiteres Interesse schenken zu sollen, weil sich die Natur und Zusammensetzung der Base aus den Analysen der anderen Salze mit Sicherheit ergibt.

Ein entsprechendes saures Hydrobromid entsteht beim Erwärmen des Thebaïns mit rauchender Bromwasserstoffsäure in geschlossener Röhre. Die hier entstehenden Krystalle sind denen des sauren Hydrochlorids ganz ähnlich. Sie zeigen auch die gleichen Löslichkeitsverhältnisse und liefern beim Kochen mit Alkohol das in diesem unlösliche neutrale Hydrobromid des Morphothebaïns.

Zur Darstellung des Morphothebaïns empfiehlt sich die Anwendung von Bromwasserstoffsäure, weil diese eine bessere

Ausbeute liefert. Nach meinen Beobachtungen ist diese auch um so günstiger, je stärker die Säure ist; ich erhielt bis zu 25 % vom Gewicht des angewandten Thebains an saurem Hydrobromid.

Das durch Kochen des sauren Hydrochlorids mit Alkohol erhaltene neutrale Hydrochlorid ist in Alkohol so gut wie unlöslich. Aus Wasser kann es umkrystallisirt werden; es wird in Form eines krystallinischen Pulvers erhalten.

Das über Schwefelsäure getrocknete Salz gab folgende Zahlen bei der Analyse:

- 1) 0,2042 Grm. gaben 0,4736 CO₂ und 0,1189 H₂O.
- 2) 0,2066 Grm. gaben 0,4800 CO₂ und 0,1202 H₂O.
- 3) 0,1716 Grm. gaben 0,1756 Ag Cl.
- 4) 0,3034 Grm. gaben 11,8 Ccm Stickstoff, gemessen bei $b = 746$ Mm. und $t = 14^{\circ}$.

Berechnet:	Gefunden:			
für C ₁₇ H ₁₇ NO ₃ HCl.	1.	2.	3.	4.
C 63,9	63,3	63,62	—	—
H 5,6	6,4	6,4	—	—
N 4,3	—	—	—	4,4
Cl 10,9	—	—	10,8	—

Das neutrale Hydrobromid, wie das chlorwasserstoffsäure Salz gewonnen, ist in Alkohol unlöslich, und löst sich auch in kaltem Wasser nur wenig; es wird in Form kleiner glänzender Prismen erhalten. Die Analyse des über Schwefelsäure getrockneten Salzes ergab folgende Zahlen:

- 1) 0,2118 Grm. gaben 0,4349 CO₂ und 0,1046 H₂O.
- 2) 0,3488 Grm. gaben 0,1778 Ag Br.

Berechnet:	Gefunden:	
für C ₁₇ H ₁₇ NO ₃ H Br.	1.	2.
C 56,4	56,0	—
H 4,94	5,4	—
Br 21,9	—	21,67

Das salpetersaure Salz des Morphothebains wurde dargestellt durch Umsetzung der erwärmten Lösung des Hydrobromides mit Silbernitrat; die filtrirte Lösung scheidet beim Abkühlen hübsche federartige Krystalle des Nitrates aus. Diese werden auch erhalten beim Lösen der freien Base in verdünnter Salpetersäure. Das Salz kann aus Wasser umkrystallisirt werden, färbt sich aber immer dabei etwas dunkel.

Das Salz enthält zwei Molecüle Krystallwasser, welche beim Trocknen bei 100° weggehen.

Berechnet:	Gefunden
für $C_{17}H_{17}NO_3 \cdot HNO_3 + 2H_2O$	
H_2O 9,3	9,2

Es wurden eine ganze Anzahl von Stickstoffbestimmungen dieses Salzes ausgeführt; dieselben lieferten aber keine übereinstimmenden Zahlen.

Das Sulfat des Morphothebains wurde aus der freien Base gewonnen, indem diese, in Wasser suspendirt, mit verdünnter Schwefelsäure bis zur vollständigen Lösung versetzt wurde; beim Umrühren scheidet sich das Salz krystallinisch aus. Dieses lässt sich aus Wasser leicht umkrystallisiren und wird in grossen Krystallen gewonnen, welche dem monoklinen Systeme anzugehören scheinen. In kaltem Wasser und in Alkohol ist das Salz wenig löslich.

Das Salz enthält 7 Molecüle Wasser, welche es im Vacuum bei 100° bis 110° verliert.

1) 0,1586 Grm. gaben 0,0252 H_2O .

2) 0,1200 Grm. gaben 0,0340 $BaSO_4$.

Berechnet:	Gefunden:
für $(C_{17}H_{17}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 + 7H_2O$	1. 2.
H_2O 15,75	15,88 —
H_2SO_4 12,2	— 11,9

Eine Lösung des Morphothebainsulfats in Wasser ist optisch inactiv.

Das freie Morphothebain wird aus den Lösungen seiner Salze durch Ammoniak, Alkalien oder deren Carbonaten gefällt in weissen amorphen Flocken, welche sich an der Luft bald blau färben. In einem Ueberschuss von Alkali ist die Base leicht löslich, und kann aus dieser Lösung durch Säuren gefällt werden. In Alkohol, Aether und Chloroform ist die Base leicht löslich; sehr wenig dagegen in Wasser.

Aus Methylalkohol oder aus Benzol krystallisirt die Base in gut ausgebildeten, glänzenden Krystallen, welche bei 190° bis 191° schmelzen.

In concentrirter Schwefelsäure löst sich das Sulfat der Base ohne charakteristische Färbung auf; beim Erwärmen schwärzt sich die Lösung.

Das Morphothebain ist nicht giftig; eine Lösung des Hydrochlorides, in Menge bis zu 0,2 Grm. einem Meer-schweinchen injicirt, blieb ganz ohne Wirkung.


Von Fällungsreactionen des Hydrochlorides des Morphothebains beobachtete ich folgende:

Mit Platinchlorid und Goldchlorid entstehen Fällungen der Doppelsalze. Diese sind jedoch amorph und werden beim Erwärmen zersetzt.

Mit molybdänsaurem Ammon entsteht ein weisser krystallinischer Niederschlag; Pikrinsäure giebt eine gelbe Fällung.

Ferrocyankalium liefert einen weissen amorphen Niederschlag; während eine Lösung von Quecksilberchlorid in Jodkalium eine gelbrothe Fällung verursacht. Jodwismuthkalium giebt eine dicke, rothbraune, amorphe Ausscheidung.

Was nun die Bildung des Morphothebains aus Thebain anbetrifft, so findet sie offenbar nach einer der beiden Gleichungen statt:



Da, wie aus den später mitzutheilenden Versuchen sich ergibt, sowohl Thebain als Morphothebain tertiäre Basen sind, können die Alkoholradicale nur aus Aethoxyl- oder Methoxylgruppen abgespalten sein; es kann sich nicht um

den Uebergang einer tertiären Base in eine secundäre handeln. Die Bildung eines Alkylchlorides gab sich schon bei der Darstellung des Morphothebäins zu erkennen, denn wie oben erwähnt wurde, öffneten sich die Röhren unter Druck und das ausströmende Gas brannte mit grüner, eine Chlorverbindung anzeigende Flamme.

Um das Vorhandensein der Hydroxylgruppen im Morphothebäin nachzuweisen, wurde zur Darstellung von Säurederivaten geschritten.

Monoacetylmorphothebäin. Diese Verbindung wird erhalten bei der Einwirkung von Essigsäureanhydrid und Natriumacetat auf bromwasserstoffsäures Morphothebäin. Das Gemisch wurde im Wasserbad einige Stunden erwärmt, das Reactionsproduct zur Entfernung von überschüssigem Anhydrid mit Alkohol behandelt, und sodann mit Wasser versetzt; die in diesem unlösliche Verbindung wurde aus verdünntem Alkohol umkrystallisirt.

Aus der Analyse ergibt sich die Zusammensetzung eines Monoacetylmorphothebäins.


0,1890 Grm. gaben 0,4705 CO_2 und 0,1104 H_2O .

Berechnet:	Gefunden:
für $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{NO}_3 (\text{C}_2\text{H}_3\text{O})$	
C 70,1	69,9
H 5,7	6,4

Die Verbindung krystallisirt in kleinen glänzenden Blättchen, welche bei 183° schmelzen.

Diese Acetylverbindung wurde mit Acetanhydrid von Neuem auf 150° erwärmt, wurde aber dabei nicht verändert; als sie dann mit Acetylchlorid in geschlossener Röhre auf 100° im Wasserbad erwärmt wurde, war ein harziges Reactionsproduct entstanden.

Es ist demnach nur gelungen, eine Acetylgruppe einzuführen, und wäre daher die Umwandlung des Thebäins in Morphothebäin durch die erste der oben gegebenen Gleichungen auszudrücken; die Beziehungen der beiden Basen würden durch folgende Formeln dargestellt:



Die chlor- und bromwasserstoffsäuren Mutterlaugen von der Darstellung des Morphothebains mussten noch eine grosse Menge von Nebenproducten enthalten, und man konnte auch mit verschiedenen Reagentien Fällungen gewinnen. Jedoch waren diese immer amorph, und es gelang nicht, irgend eine Verbindung zu erhalten, mit der man mit Aussicht auf Erfolg hätte weiter arbeiten können.

Die Einwirkung von Jodwasserstoffsäure auf Thebain verlief nicht in der gleichen Richtung, wie die der Salzsäure und Bromwasserstoffsäure. Es wurden als Producte derselben nur schmierige Körper erhalten, und dürfte dies wohl auf die reducirenden Eigenschaften der Jodwasserstoffsäure zurückzuführen sein.

Da es nicht unmöglich war, dass das Morphothebain erst secundär aus Thebenin entstehe, wurde ein Versuch gemacht, dieses in Morphothebain überzuführen, und es zu dem Zweck unter den gleichen Bedingungen wie Thebain mit rauchender Bromwasserstoffsäure behandelt; aber es wurde nur ein amorphes, harziges Product erhalten.

Um die Natur des Thebains festzustellen, wurde sein Verhalten gegen Alkyljodide untersucht; wie man wohl schon voraussetzen durfte, verhält es sich als tertiäre Base; die Alkyljodide werden einfach addirt.

Addition von Alkyljodiden an Thebain.

Thebainmethyljodid. Thebain wurde mit Methyljodid und Methylalkohol kurze Zeit im Wasserbad erwärmt und sodann wasserfreier Aether zugesetzt. Dieser fällt das bald krystallinisch werdende Additionsproduct aus. Beim

UmkrySTALLISIREN aus Alkohol, in welchem es ziemlich leicht löslich ist, erhält man schwach gelb gefärbte, kurze Prismen.

Die aus Alkohol erhaltenen Krystalle enthalten ein Molecül Alkohol, welcher bei 100° im Vacuum weggeht.

Die lufttrockenen Krystalle gaben bei der Analyse folgende Zahlen:

- 1) 0,2409 Grm. gaben 0,4607 Grm. CO₂ und 0,1377 H₂ O.
- 2) 0,2093 Grm. gaben 0,4050 Grm. CO₂ und 0,1150 H₂ O.
- 3) 0,4136 Grm. verloren bei 100° 0,0390 Grm. C₂ H₅ OH.
- 4) 0,3618 Grm. verloren bei 100° 0,0351 Grm. C₂ H₅ OH.

Berechnet:		Gefunden:			
für C ₁₉ H ₂₁ NO ₃ CH ₃ J + C ₂ H ₆ O		1.	2.	3.	4.
C	53,0	52,1	52,77	—	—
H	6,2	6,1	6,1	—	—
C ₂ H ₆ O	9,2	—	—	9,4	9,7

Die bei 100° im Vacuum alkoholfrei gemachte Substanz lieferte folgende Zahlen:

- 1) 0,2588 Grm. gaben 0,5017 CO₂ und 0,1256 H₂ O.
- 2) 0,2402 Grm. gaben 0,4639 CO₂ und 0,1141 H₂ O.

Berechnet:		Gefunden:	
für C ₁₉ H ₂₁ NO ₃ CH ₃ J:		1.	2.
C	53,0	52,87	52,5
H	5,3	5,4	5,2

Thebaïnaethyljodid. Wie bei der Methyljodidverbindung wurde die Base mit Aethyljodid behandelt und das durch Aether gefällte Additionsproduct aus Alkohol umkrySTALLISIRT. Es krystallisirt aus Alkohol in feinen, gelblichen Nadeln, welche keinen Alkohol enthalten wie das Methyljodidderivat.

Thebaïnbenzylchlorid wurde dargestellt durch Erwärmen des Thebaïns mit Benzylchlorid in alkoholischer Lösung. Die entstehende Verbindung krystallisirt aus Alkohol in sternförmig vereinigten Nadeln.

Auch das aus dem Thebaïn entstehende Morphothebain ist eine tertiäre Base; es addirt leicht Alkylhalogene; das bei der Umwandlung abgespaltene Alkyl kann daher nicht an Stickstoff gebunden gewesen sein.

Addition von Alkyljodiden an Morphothebain.

Morphothebainmethyljodid. Wenn man die Base mit Methyljodid in methylalkoholischer Lösung einige Zeit im Wasserbad erwärmt, findet eine Ausscheidung von Krystallen statt, welche die Form quadratischer Tafeln haben, und meist etwas braun gefärbt sind. In Alkohol ist diese Verbindung nicht löslich, sie konnte dagegen aus starker Essigsäure leicht umkrystallisirt werden. Die Analyse beweist die Zusammensetzung $C_{17}H_{17}NO_3CH_3J$.

- 1) 0,1721 Grm. gaben 0,3205 CO_2 und 0,0848 H_2O .
- 2) 0,2428 Grm. gaben 0,4554 CO_2 und 0,1212 H_2O .

Berechnet für:	Gefunden:	
$C_{17}H_{17}NO_3CH_3J$.	1.	2.
C 50,8	50,78	51,1
H 4,7	5,4	5,5

Morphothebainäethyljodid. Eine ätherische Lösung der Base wurde auf dem Wasserbad mit Äethyljodid erwärmt; das sich ausscheidende Additionsproduct ist wie das Morphothebainmethyljodid in Alkohol unlöslich. Aus Essigsäure umkrystallisirt bildet es gut ausgebildete, anscheinend rhombische Krystalle.

Das Morphothebainbenzylchlorid, auf gleiche Weise dargestellt, bildet kleine Nadeln; es ist in Wasser ziemlich leicht löslich, wenig dagegen in Alkohol.

Wie in der Einleitung schon ausgesagt, konnten v. Gerichten und Schrötter beweisen, dass das Morphin ein Derivat des Phenanthrens sei. Sie erhielten diesen Kohlenwasserstoff sowohl durch Vermittelung einer Destillation mit

Zinkstaub, als auch aus den Zersetzungsproducten der oben genannten Ammoniumhydroxyde. Von ganz besonderem Interesse musste nun der Nachweis sein, ob auch Thebain ein Derivat des Phenanthrens sei. Zu diesem Zwecke schien mir das Thebainmethylhydroxyd verwendbar, da ein Versuch zeigte, dass sich schon dieses selbst zersetzt, dass nicht eine Umwandlung in eine dem Methylmorphimethin entsprechende Verbindung nothwendig ist, wozu wohl das schwierig zu beschaffende Material gefehlt haben würde.

Zersetzung des Thebainmethylhydroxydes.

Fein gepulvertes Thebainmethyljodid wurde in Wasser suspendirt und mit frischgefälltem Silberoxyd in geringem Ueberschusse anhaltend geschüttelt und zur Vollendung der Umsetzung noch einen Tag lang, ohne zu erwärmen, stehen gelassen. Die von dem Jodsilber abfiltrirte Lösung ist stark alkalisch und riecht nach Trimethylamin.

Um die Zersetzung herbeizuführen, wurde die Lösung im Wasserbade erwärmt und ein Wasserstoffstrom hindurchgeleitet. Die entstehende flüchtige Base wurde in Chlorwasserstoffsäure aufgefangen. Während des Erwärmens schieden sich aus der Lösung dunkelgefärbte, theerige Producte aus. Nach mehrstündigem Erwärmen schien die Reaction beendet zu sein, und es wurde Wasserdampf eingeleitet, um die flüchtigen Basen vollkommen überzutreiben.

Die salzsaure Lösung der flüchtigen Basen wurde zunächst einer Untersuchung unterworfen. Die nach dem Entfernen der überschüssigen Salzsäure zurückbleibenden Hydrochloride wurden in wenig Wasser gelöst und mit Platinchlorid versetzt, wodurch ein gelbes Platinsalz krystallinisch ausgefällt wurde. Dieses ist schon in kaltem Wasser löslich, aber unlöslich in Alkohol; aus Wasser umkrystallisirt, wird es in kleinen glänzenden Blättchen erhalten. Da eine mikroskopische Untersuchung zeigte, dass noch kleine Verunreinigungen anhafteten, wurde das Salz noch mit heissem Alkohol behandelt; es sah dann vollkommen homogen aus.

Die Analyse gab folgende Resultate:

- 1) 0,4275 Grm. gaben 0,2137 CO₂ und 0,1385 H₂ O.
- 2) 0,1973 Grm. gaben 0,0731 Pt.

Gefunden:	Berechnet:
	für (NC ₃ H ₉ HCl) ₂ PtCl ₄
C 13,6	13,5
H 3,59	3,77
Pt 37,05	37,16

Diese Zahlen kommen den für das Platinsalz des Trimethylamins berechneten sehr nahe, aber dieses ist nach A. W. Hofmann und Hesse¹ in Alkohol leicht löslich; auch ein directer Vergleich mit dem Trimethylaminplatinsalz spricht nach meiner Beobachtung nicht für eine Identität der vorliegenden Base mit dem Trimethylamin.

Eine primäre Base liegt auch nicht vor, denn die Carbylaminreaction nach Hofmann konnte ich nicht beobachten.

Setzt man zu der Lösung des Hydrochlorides Bromwasser, so tritt sofort Entfärbung ein, und es entsteht ein Niederschlag; diesen halte ich für ein Additionsproduct. Aus ihm wurde ein Platinsalz gewonnen, welches Brom und 30,01⁰/₀ Platin enthielt. Dieses Verhalten deutet vielleicht auf ein ungesättigtes Amin; die oben mitgetheilte Analyse würde auch auf ein solches für eine Base NC₃ H₇ stimmen:

Berechnet:	Gefunden:
für (C ₃ H ₇ NHCl) ₂ Pt Cl ₄	
C 13,7	13,6
H 3,05	3,59
N 37,0	37,05

Zu einer weiteren Untersuchung der flüchtigen Base reichte leider das Material nicht aus.

¹ Eisenberg (Ber. 13. 1667) behauptet die Schwerlöslichkeit des Trimethylaminplatinchlorides.

Der Rückstand von der Zersetzung des Thebainmethylhydroxydes, die wässrige Lösung und die schon erwähnten ausgeschiedenen theerigen Producte boten einer Untersuchung viele Schwierigkeiten. In der wässrigen Lösung sind noch basische Körper, welche in Form der Platinsalze abgeschieden wurden; es zeigte sich jedoch, dass diese nicht einheitlich waren, und da sie auch nicht krystallisirten, musste bei der geringen Menge derselben von einer Untersuchung abgesehen werden.

Die nichtbasischen Spaltungsproducte wurden einer successiven Behandlung mit Eisessig, mit Alkohol und Chloroform unterworfen und die schwerlöslichen Producte sodann in wenig Nitrobenzol gelöst. Auf Zusatz von Petroleumäther scheiden sich aus dieser Lösung bei längerem Stehen kleine Nadeln aus.

Diese Nadeln enthalten keinen Stickstoff, sie sind wenig löslich in Alkohol, unlöslich in Petroleumäther, Chlorwasserstoffsäure oder Alkalien, löslich dagegen in Eisessig, Nitrobenzol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff.

Die Analyse von Substanz verschiedener Darstellung gab die folgenden Zahlen:

- 1) 0,2385 gaben 0,6485 CO_2 und 0,1152 H_2O .
- 2) 0,1469 gaben 0,3908 CO_2 und 0,0730 H_2O .
- 3) 0,1798 gaben 0,4848 CO_2 und 0,0910 H_2O .

Gefunden:	1.	2.	3.
C	74,1	72,5	73,5
H	5,3	5,5	5,6

Als wahrscheinlichste Formel berechnet sich danach die Formel: $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_3$, welche verlangt:

C	73,6
H	5,26

Bei 280° schmilzt die Verbindung noch nicht.

Durch Behandlung dieses Spaltungsproductes mit Salpetersäure erhielt ich einen gut charakterisirten Körper, welcher den Eigenschaften nach ein Oxychinon sein könnte. Zur Darstellung dieser Verbindung wurde der vorerwähnte

Körper in Eisessig gelöst, und wenige Tropfen concentrirter Salpetersäure zugesetzt. Aus der Lösung schied sich beim Stehen eine rothbraune Verbindung ab, welche aus Nitrobenzol, Alkohol und Aether umkrystallisirt werden konnte.

Die Analyse dieses in Alkali löslichen Körpers gab folgende auf die Formel: $C_{12}H_8O_3$ stimmende Zahlen:

0,1994 Grm. gaben 0,5229 CO_2 und 0,0725 H_2O .

Berechnet für: $C_{12}H_8O_3$ Gefunden:

C 72,00



71,5

H 4,00



4,04

Aus dem Theer, welcher bei der Zersetzung des Thebainmethylhydroxydes entsteht, konnten ausser der beschriebenen Verbindung $C_{14}H_{12}O_3$ keine Verbindungen isolirt werden, es schienen phenolartige Körper vorhanden zu sein. — Die Versuche in dieser Richtung mussten damit abgebrochen werden.

Die Zersetzung des Thebainmethylhydroxydes verläuft offenbar complicirt; die Ausbeute an den beschriebenen Verbindungen ist nur gering; und es ist nach den vorhandenen Beobachtungen nicht möglich, eine Gleichung für die Spaltung zu geben. Versucht man jedoch, sich eine Vorstellung von den Beziehungen der beiden Verbindungen $C_{14}H_{12}O_3$ und $C_{12}H_8O_3$ zu machen, so kommt in Betracht, dass die zweite die Eigenschaften eines Oxychinons hat. Vielleicht sind ihre Beziehungen in folgenden Formeln auszudrücken:




Danach würde dann auch im Thebain ein Aethoxyl vorhanden sein, während die Auffassung dieser Base als eines Dimethyläthers für jene Verbindungen zu den folgenden unwahrscheinlichen Formeln führen würde:



Sowohl diese Betrachtungen als die Beobachtung, dass Morphothebain nur ein Säureradikal aufnimmt, weisen auf ein Aethoxyl im Thebain hin; jedoch möchte ich es für

nicht unwahrscheinlich halten, dass dennoch zwei Methoxyle vorhanden sind. Käme dem Oxydationsproduct des Spaltungsproducts $C_{14}H_{12}O_3$ nicht die Zusammensetzung $C_{12}H_8O_3$, sondern $C_{12}H_6O_3$ zu (Berechnet 72,72 C u. 3,04 H, Gefunden 71,5 C u. 4,04 H), so würden die Beziehungen der beiden Verbindungen durch folgende Formeln dargestellt:



Die Chinonnatur der zweiten Verbindung gegenüber der farblosen ersteren würde in diesen Formeln eine bessere Erklärung finden.

Als Wahrscheinlichkeitsgrund gegen die Annahme eines Aethoxyl im Thebain darf vielleicht auch bemerkt werden, dass das Aethyl als Bestandtheil in der Natur vorkommender Verbindungen nur sehr selten beobachtet wurde.


Dieses sind jedoch nur Vermuthungen, da ich selbst die Zusammensetzung jener Verbindungen nicht als sicher angeben kann. Eine sichere Entscheidung der Frage, ob Thebain ein Phenanthrenderivat sei wie Morphin, haben die vorstehenden Versuche nicht erbracht; jedoch scheint dieselbe zu verneinen zu sein.

Als wesentliches Resultat der vorstehend mitgetheilten Versuche ergibt sich Folgendes:

- 1) Thebain ist eine tertiäre Base.
- 2) Einwirkung von concentrirter Chlor- oder Bromwasserstoffsäure auf Thebain $C_{19}H_{21}NO_3$ führt zu einer Base $C_{17}H_{17}NO_3$: Morphothebain.
- 4) Morphothebain enthält ein Hydroxyl, da ein Monoacetylderivat dargestellt werden konnte. Danach würde die Entstehung dieser Base aus Thebain wie folgt auszudrücken sein:

$$C_{19}H_{21}NO_3 + HCl = C_{17}H_{17}NO_3 + C_2H_5Cl;$$

neben derselben ist jedoch folgende Gleichung noch zu berücksichtigen:



Eine Entscheidung, ob Thebain ein Aethoxyl oder zwei Methoxyle enthalte, brachten die Versuche noch nicht.

3) Morphothebain ist eine tertiäre Base.

5) Das Additionsproduct des Thebains mit Methyljodid wird durch Behandlung mit Silberoxyd und Erwärmen gespalten. Die Spaltung verläuft complicirt und konnte nicht vollständig untersucht werden. Der entstehenden flüchtigen Base kommt die Zusammensetzung NC_3H_9 oder NC_3H_7 zu, während die Analysen der stickstofffreien Verbindung auf die Formel $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_3$ führen. Die Behandlung der letzteren mit Salpetersäure lieferte eine Verbindung $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_3$. Macht man die Voraussetzung, dass die beim Uebergang des Thebains in Morphothebain austretenden Alkyle noch in jenem Spaltungsproduct enthalten sind, wozu man berechtigt ist, so würde daraus folgen, dass dem Thebain nicht das Phenanthren zu Grunde liegt.

6) Ein bedeutsamer Unterschied des Thebains vom Morphin resp. Codein zeigt sich darin, dass das Thebain sich schon nach Anlagerung des ersten Alkyljodids spaltet, während aus dem Codein das Methylmorphimethin dargestellt werden muss, und erst die aus diesem entstehende Ammoniumbase der Spaltung unterliegt. Aus diesem Verhalten würde gemäss dem in der Einleitung Gesagten folgen, dass im Thebain der Stickstoff nicht in einem Ring gebunden ist. Danach wäre das Thebain nicht als Pyridin-Derivat aufzufassen.

Meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Zincke und Herrn Dr. W. Roser, unter deren Leitung ich die mitgetheilten Versuche im chemischen Institute der Universität Marburg ausführte, bin ich für die Hülfe, die sie mir zu Theil werden liessen, zu grossem Danke verpflichtet.
